

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-4-71 177503

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F  
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction  
Départementale de l'Agriculture  
à Châlons-sur-Marne

Supplément n° 3 au BULLETIN n° 127 d'AVRIL 1971

26 Avril 1971 / n° 8

## V I G N E

Rot Brenner ou rougeot parasitaire : Une protection contre ce champignon doit être mise en place dès le stade 2-3 feuilles, plus particulièrement dans les régions où l'on a observé des attaques sensibles en 1970.

## A R B O R I C U L T U R E   F R U I T I E R E

Tavelures du pommier et du poirier : Les pluies survenues le 23 et se poursuivant actuellement ont permis les premières contaminations par ascospores (projections confirmées par les captures en nature d'un nombre important de celles-ci). Il est recommandé d'assurer dès que le temps le permettra une nouvelle protection des arbres, plus particulièrement entre le 5 et le 10 mai, dates auxquelles nous prévoyons l'apparition des premières taches sur feuillage.

Oïdium du pommier : La protection doit se poursuivre complétée par la coupe des pousses oïdiées.

Monilia sur cerisiers-pruniers : Renouveler le plus rapidement possible la protection des arbres; poursuivre l'enlèvement des bouquets foliaires atteints sur lesquels le champignon fructifie abondamment.

Chenilles défoliatrices : Les premiers dégâts ont été constatés. Ajouter à la bouillie anti-tavelure un insecticide.

Sur toutes cultures et en période de floraison sont seules autorisées les matières actives suivantes non dangereuses pour les abeilles : Diéthion, Phosalone, Endosulfan, Chinométhionate, Chlorphénamide, Dicofol, Tetradifon, Tetrasul, Thioquinox, Pyrèthrine, Roténone, Toxaphène, Polychlorocamphane.

Araignées rouges (P. ulmi) : Si les températures des 20, 21, 22 et 24 Avril ont favorisé d'importantes éclosions de *Panonychus ulmi*, le pourcentage d'oeufs non éclos reste encore élevé, aussi est-il nécessaire de reporter toute intervention.

## G R A N D E   C U L T U R E

Charançons des siliques sur colza d'hiver : Il n'y a pas à envisager d'intervention contre cet insecte dans les tout prochains jours.

Meligèthes sur colza d'hiver : Malgré les conditions climatiques moins favorables à l'activité du méligèthe surveiller les cultures tardives et intervenir avant dégât sérieux.

Mildiou de la pomme de terre : Avant la généralisation des levées des pommes de terre, il est rappelé que les tas de déchets de triage, constituent un risque très grave en favorisent l'installation de la maladie sur les nouvelles cultures. Tous ces déchets doivent être soigneusement détruits ou enterrés sous une épaisseur ne permettant pas la sortie des repousses.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,  
R. PARIS  
H. de MEIRLEIRE et A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire "CHAMPAGNE",

J. DELATRE